AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE CHAMPAGNE (Tél. 47-22-87)
(AISNE, ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE, MEUSE)
Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 5, place Paul-Jamot - REIMS.
C. C. P. CHALONS-SUR-MARNE 2.802-15

ABONNEMENT ANNUEL
12 NF

Bulletin Nº 24 de Septembre 1962 — 4 Septembre 1962

VIGNE

INFORMATION

ACARIOSE DE LA VIGNE

Nous rappelons notre information du 2 Août dernier (bulletin Nº 23), par laquelle nous conseillions de renouveler l'application d'un traitement acaricide, notamment dans les parcelles touchées par les attaques printanières ; ce traitement pourra être effectué jusqu'au 15 Septembre.

ARBRES FRUITIERS

AVERTISSEMENT

TAVELURE DU POMMIER ET DU POIRIER

Dans tous les vergers, appliquer un traitement contre les attaques tardives de cette maladie.

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Ajouter à la bouillie fongicide un produit destiné à contrôler les pénétrations larvaires, encore à craindre actuellement.

Respecter les limites légales d'utilisation des divers insecticides (bulletin du 24 Juillet).

P.52

GRANDE CULTURE

INFORMATIONS

ALTERNARIA ET PHOMA DU COLZA

Afin de limiter l'extension de ces deux maladies sur les futures cultures , il est absolument indispensable de traiter correctement les semences. Le thirame (T.M.T.D.) à la dose de 300 g. de matière active par quintal est le produit le plus recommandable.

PETITES ALTISES DU COLZA

Surveiller les cultures dès le début de la levée et éventuellement intervenir avant la généralisation des dégâts.

Le poudrage des semences avec un produit à base de lindane (ou l'utilisation d'un produit mixte thirame-lindane) permet d'assurer la protection des jeunes plantes contre d'éventuelles attaques. Toutefois, ce n'est qu'une disposition d'assurance, les dégâts de petites altises étant relativement rares.

Ce traitement est insuffisant pour lutter contre la grosse altise du colza (ou altise à tête dorée) qui fera l'objet d'un avis ultérieur.

PEGOMYIE DE LA BETTERAVE

Les pontes de pégomyie de troisième génération, observées depuis le 20 Août, s'intensifient en particulier dans les secteurs le plus récemment envahis.

Bien qu'une proportion sensible d'oeufs avortent, des dégâts larvaires sont à redouter à partir du 10 Septembre pour s'extérioriser vers le 25 Septembre.

Un traitement ne paraît pas indispensable dans la mesure ou les exploitants ayant des champs très touchés pourront arracher ces betteraves avant la "repousse", à craindre à partir du 5 Octobre.

Les Contrôleurs chargés des Avertissements Agricoles	l'Inspecteur de la Circonscription Phytosanitaire de REIMS

Imprimerie de la Station de Champagne -Directeur-Gérant : L. BOUYX